

Агентства лесного хозяйства при Правительстве
Республики Таджикистан

Тема: Орехоплодные деревья Таджикистана и их фитосанитарного состояния

Рустам Тагоев - директор Государственного учреждения лесного хозяйства «Ромит»

Основные виды орехоплодных деревьев и их географическое распределение

► Фисташка настоящая

Pistacia vera

Площадь- более 80 тыс. га

Южные районы

► Орех грецкий

Juglans regia

Площадь- более 18 тыс. га

Центральные западные районы

Миндаль обыкновенный

Amygdalus vulgaris

Площадь -более 9,5 тыс. га

Центральные и южные районы.



Фисташка настоящая (*Pistacia vera*) — встречается преимущественно в южных районах Хатлонской области.



Миндаль обыкновенный (*Amygdalus vulgaris*) —
произрастает в центральных и южных районах страны.



Грецкий орех (*Juglans regia*) — широко распространён в горных районах Таджикистана, особенно в Раштской долине, Согдийской области и ГБАО.



Основные направления использования орехоплодных деревьев

- ▶ Получение недревесных лесных продуктов (орехов)
- ▶ Защита почв от эрозии и повышение устойчивости лесных экосистем.
- ▶ Использование древесины в мебельном производстве и строительстве.



Торговля (импорт и экспорт) орехоплодной продукции

- ▶ Экспорт фисташки и миндаля обыкновенного в соседние страны и на международные рынки (Афганистан, Кыргызстан)
- ▶ Импорт посадочного материала и селекционных сортов (Иран, Турция)
- ▶ Импорт орехов фисташки и пекана (Иран, Турция, Китай)

Основные вредители и болезни орехоплодных

Фисташка настоящая

Вредители: Жук листоед, Долгоносик, Фисташковая плодожорка, Фисташковая моль, Трипсы, Паутинный клещ, Цикадка.

Болезни: Септориоз, Цилиндроспориоз, Фузариоз, Аскомикота,

Орех грецкий

Вредители: Ореховая плодожорка, Ореховая моль, Ореховая тля Майский жук, Ореховая златка, Ореховый клещ, Американская белая бабочка, Ореховая минирующая моль -пестрянка

Болезни: Марсониоз, Бактериоз, Филлоктикоз, Бактериальный ожог, Эдафический хлороз, Обыкновенный (европейский) рак, Стволовые паразиты

Миндаль обыкновенный

Вредители: Тля, Вредоносные клещи, Сливовый короед-заболонник, Червецы

Болезни: Монилиоз или плодовая гниль, Кистероспориоз, Курчавость листьев, Гомоз или Камедотечение,

Текущие методы борьбы с вредителями и болезнями, применяемые в Таджикистане

- ▶ Регулярный фитосанитарный мониторинг.
- ▶ Применение разрешённых средств защиты растений.
- ▶ Санитарная обрезка и уничтожение заражённых частей растений.
- ▶ Соблюдение агротехнических мероприятий.
- ▶ Использование устойчивых сортов и качественного посадочного материала.

Потребности и проблемы в управлении вредителями и болезнями

- ▶ Недостаток квалифицированных специалистов в области защиты растений.
- ▶ Необходимость повышения квалификации кадров и проведения обучающих мероприятий.
- ▶ Недостаточное оснащение лабораторий современным диагностическим оборудованием.
- ▶ Необходимость совершенствования системы мониторинга и раннего выявления вредителей и болезней.
- ▶ Расширение международного сотрудничества и обмена информацией и опытом по защите растений.





Спасибо за внимание!